




内視鏡的大腸粘膜下層剥離術を受けられる方へ



ID： _____ 患者氏名： _____ 担当医師： _____ 担当看護師： _____.

項目 \ 月日	/		/		/	/	/			
	入院当日		術当日（術前）		術当日（術後）		手術後 1 日目	術後 2 日目	退院日	
目標	治療の準備ができるよう援助します。		発熱など体調不良がなく、治療が受けられるよう援助します。		不安なく治療が受けられ、出血・穿孔などの合併症なく経過できるよう援助します。				退院後の生活が理解できるよう援助します。	
治療・薬剤 （点滴・内服） 処置・リハビリ	・現在、飲んでいる薬があればお知らせください。 ・必要に応じて、リハビリテーションを行います。 ・寝る前(夜 9 時)に下剤を飲んでいただきます。 （センシド 2 錠、ピコスルファートナトリウム内服液 1 本） 		・中止の指示がある薬以外は 7 時まで内服薬を内服して下さい。 ・9 時頃から下剤を飲んでいただきます。 （ニフレック 2 L） ・下剤を飲み終わってから、点滴を行います。 		飲水が可能になったら中止薬以外の内服薬を服用します。  治療中、血栓予防のため間欠的空気圧迫装置を両足に付けます。 		治療日から継続して点滴を行います。 	中止薬がある場合は再開の時期を説明します。術後 2 日目から点滴が 1 日 1 本となります。 		
検査					内視鏡室で治療を行います。 		早朝に血液検査があります。 午前中にレントゲン検査を行います。  			
活動・安静度	特に制限はありません。		点滴に注意してお過ごしください。		治療後、2 時間ベッドで安静にして下さい。 治療後は麻酔の影響でふらつくことがありますので、トイレ歩行以外は安静にお過ごしください。		検査には車椅子で行きます。 その後は病棟内を自由に動いていただけます。 	術後 2 日目から院内自由になります。 		
食事	21 時以降は食べることはできません。		何も食べることができません。  		治療後 2 時間経過し、腹痛・吐き気など症状がなければ水・お茶を飲めます。 			術後 2 日目から流動食が始まります。 病院食以外は食べないで下さい。	次回外来に来られるまでは、消化の良いもの、柔らかい物を食べるようにしてください。禁酒、禁煙して下さい。   	
清潔			清拭を行います。 				術後翌日からシャワー浴ができます。 		退院日から入浴ができます。 	
患者様及び ご家族への説明 栄養指導 服薬指導	入院オリエンテーションをします。 同意書の確認を行います。 入院診療計画書に沿って、治療の説明をします。 分からないことがあれば遠慮せずにお尋ねください。  		治療中、ご家族は連絡がつく状態にして下さい。必要時は来院をお願いすることがございます。ご家族の方が来られる場合は、ラウンジで待機して頂きます。 医師から説明がある場合 治療が終了し患者様を迎えに行くときに一緒に内視鏡室までご案内致します。 		治療後、最初の歩行はふらつきますので、看護師を呼んで下さい。 術後に便が出る場合があります。初回は必ず看護師に見せて下さい。 普通と違う便の色が出た場合は看護師にすぐ知らせて下さい。 嘔気、嘔吐、腹痛などがありましたら、すぐに看護師にお知らせください。 		普通と違う便の色が出た場合は看護師にすぐ知らせて下さい。 嘔気、嘔吐、腹痛などがありましたら、すぐに看護師にお知らせください。 		会計用紙をお渡しします。 退院療養計画書をお渡しします。 お薬をお渡しします。 次回受診の説明をします。 術中の組織検査の結果は、外来でお伝えしますので必ずご家族と一緒に来てください。 退院後の生活について看護師より説明があります。 	

※上記内容について、患者さんの状態により変更が生じる場合があります。