【大腸がん】SOX＋Bev療法

点滴	Day 1		
	①	ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ注0.75mg ﾎｽﾈｯﾋﾟﾀﾝﾄ注235mｇ ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ注1.65mｇ ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ注3.3mｇ	(30分)
	②	生理食塩液100mL ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ注（7.5mg/kg）	(90分⇒60分⇒30分)
	③	精製ﾌﾞﾄﾞｳ糖5%250mL ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ注1.65mｇ ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ注（130mg/㎡）	(120分)
	④	生理食塩液50mＬ	(ﾌﾗｯｼｭ用)
内服	Day 1-14		
	○ﾃｶﾞﾌｰﾙ・ｷﾞﾒﾗｼﾙ・ｵﾃﾗｼﾙｶﾘｳﾑ配合OD錠(80mg/㎡/日)　2× 朝夕食後 体表面積＜1.25㎡　80mg 2× 1.25㎡≦体表面積＜1.50㎡　100mg 2× 1.50㎡≦体表面積　120mg 2×		
	Day 2-4		
	ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ錠4mg　1錠 1×　朝食後		
ｻｲｸﾙ	21日ｻｲｸﾙ		

一般財団法人 竹田健康財団 竹田綜合病院

-------【お問合せ先】-------
TEL：0242-29-8335(薬剤科)

【大腸がん】Pmab+CPT-11療法

点滴	Day 1		
	①	ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ注0.75mg ﾎｽﾈｯﾋﾟﾀﾝﾄ注235mg ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ注1.65mg ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ注3.3mg	(30分)
	②	生理食塩液50mL	(ﾌﾗｯｼｭ用)
	③	生理食塩液100mL ﾊﾟﾆﾂﾑﾏﾌﾞ注（6mg/kg）	(60分)
	④	生理食塩液50ｍＬ	(ﾌﾗｯｼｭ用)
	⑤	精製ﾌﾞﾄﾞｳ糖5%250mL イリノテカン塩酸塩水和物注(150mg/㎡)	(90分)
	④	生理食塩液50ｍＬ	(最終ﾌﾗｯｼｭ用)
内服	Day1-4		
	炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ　1.8g3×朝昼夕食後 ｳﾙｿﾞﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸錠100mg　3錠3×朝昼夕食後 酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ錠330mg　3錠3×朝昼夕食後		
	Day-3～4		
	半夏瀉心湯　7.5g 3×朝昼夕食前		
	Day 2-4		
	ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ錠4mg　1錠　1×　朝食後		
ｻｲｸﾙ	14日ｻｲｸﾙ		

一般財団法人 竹田健康財団 竹田綜合病院

-------【お問合せ先】-------
TEL：0242-29-8335(薬剤科)

【大腸がん】IRIS療法

点滴	Day 1.15		
	①	ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ注0.75mg ﾎｽﾈｯﾋﾟﾀﾝﾄ注235mg ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ注1.65mg ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ注3.3mg	(30分)
	②	ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩酸塩注(125mg/㎡) 精製ﾌﾞﾄﾞｳ糖5%250mL	(90分)
	③	生理食塩液50mL	(最終フラッシュ)
内服	Day 1-14		
	○ﾃｶﾞﾌｰﾙ・ｷﾞﾒﾗｼﾙ・ｵﾃﾗｼﾙｶﾘｳﾑ配合OD錠(80mg/㎡/日)　2× 朝夕食後 体表面積＜1.25㎡　80mg 2× 1.25㎡≦体表面積＜1.50㎡　100mg 2× 1.50㎡≦体表面積　120mg 2×		
内服	Day1-4		
	炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ　1.8g3×朝昼夕食後 ｳﾙｿﾞﾃｵｷｼｺｰﾙ酸錠100mg　3錠3×朝昼夕食後 酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ錠330mg　3錠3×朝昼夕食後		
	Day-3～4		
	半夏瀉心湯　7.5g 3×朝昼夕食前		
	Day 2-4		
	ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ錠4mg　1錠　1×　朝食後		
ｻｲｸﾙ	28日ｻｲｸﾙ		

一般財団法人 竹田健康財団 竹田綜合病院

-------【お問合せ先】-------
TEL:0242-29-8335(薬剤科)

【大腸がん】SIRB療法

点滴	Day 1		
	①	ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ注0.75mg ﾎｽﾈｯﾋﾟﾀﾝﾄ注235mg ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ注3.3mg ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ注1.65mg	(30分)
	②	ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ注(7.5mg/kg) 生理食塩液100mL	(90分⇒60分⇒30分)
	③	ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩酸塩注(150mg/㎡) 精製ﾌﾞﾄﾞｳ糖5%250mL	(90分)
	④	生理食塩液50mL	(最終フラッシュ)
内服	Day 1-14		
	○ﾃｶﾞﾌｰﾙ・ｷﾞﾒﾗｼﾙ・ｵﾃﾗｼﾙｶﾘｳﾑ配合OD錠(80mg/㎡/日)　2× 朝夕食後 体表面積＜1.25㎡　80mg 2× 1.25㎡≦体表面積＜1.50㎡　100mg 2× 1.50㎡≦体表面積　120mg 2×		
内服	Day1-4		
	炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ　1.8g3×朝昼夕食後 ｳﾙｿﾞﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸錠100mg　3錠3×朝昼夕食後 酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ錠330mg　3錠3×朝昼夕食後		
	Day-3～4		
	半夏瀉心湯　7.5g 3×朝昼夕食前		
	Day 2-4		
	ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ錠4mg　1錠　1×　朝食後		
サイクル	21日サイクル		

一般財団法人 竹田健康財団 竹田綜合病院

-------【お問合せ先】-------
TEL：0242-29-8335(薬剤科)

【大腸がん】XELIRI＋Bev療法

点滴	Day 1		
	①	ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ注0.75mg ﾎｽﾈｯﾋﾟﾀﾝﾄ注235mg ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ注1.65mｇ ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ注3.3mｇ	（30分）
	③	生理食塩液100mL ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ注（7.5mg/kg）	（90分⇒60分⇒30分）
	④	精製ﾌﾞﾄﾞｳ糖5%250mL ｲﾘﾉﾃｶﾝ塩酸塩注（200mg/㎡）	（90分）
	⑤	生理食塩液50mＬ	（最終フラッシュ用）
内服	Day 1-14		
	カペシタビン錠300mg（1600mg/㎡）　2×朝夕食後 1.36㎡未満：2400mg　2× 1.36㎡以上1.66㎡未満：3000mg　2× 1.66㎡以上1.96㎡未満：3600mg　2× 1.96㎡以上：4200mg　2×		
	Day 1-4		
	炭酸水素ﾅﾄﾘｳﾑ　1.8g 3×朝昼夕食後 ｳﾙｿﾞﾃﾞｵｷｼｺｰﾙ酸錠100mg　3錠3×朝昼夕食後 酸化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ錠330mg　3錠3×朝昼夕食後		
	Day-3～4		
	半夏瀉心湯　7.5g 3×朝昼夕食前		
	Day 2-4		
	ﾃﾞｷｻﾒﾀｿﾞﾝ錠4mg　1錠 1×　朝食後		
サイクル	21日サイクル		

一般財団法人 竹田健康財団 竹田綜合病院

-------【お問合せ先】-------
TEL：0242-29-8335(薬剤科)